Betrag einer Zahl

Erinnere dich, dass der **Betrag** einer Zahl ihr Abstand von 0 auf der Zahlengerade ist:



Der Betrag von 3 ist also 3. Wir schreiben kurz: $|3| = 3$

Der Betrag von -3 ist auch 3. Wir schreiben kurz: $|-3| = 3$

Die senkrechten Striche heißen **Betragsstriche**.

Betragsstriche werden wie Klammern zuerst ausgewertet: $\overbrace{|3-5|\cdot 2}^{=|-2|\cdot 2=4} \neq \overbrace{3-5\cdot 2}^{=-7}$

Betragsstriche entfernen

Das Ergebnis von $|x|$ hängt vom Vorzeichen von x ab. Stelle jeweils mithilfe von x eine Formel auf:

- **Fall 1:** Wenn $x \geq 0$ ist, dann gilt: $|x| = \boxed{}$
- **Fall 2:** Wenn $x < 0$ ist, dann gilt: $|x| = \boxed{}$

Zum Beispiel: $|3| = 3$

$|-3| = -(-3) = 3$

Beachte, dass $-x$ eine *positive* Zahl ist, wenn x eine *negative* Zahl ist.

Kürzer schreiben wir bei solchen Fallunterscheidungen auch: $|x| = \begin{cases} \boxed{} & \text{, falls } x \geq 0 \\ \boxed{} & \text{, falls } x < 0 \end{cases}$

Rechenregel für Beträge?

Für jede Zahl $x \in \mathbb{R}$ gilt: $(x-5)+5 = x$

Gibt es eine Zahl $x \in \mathbb{R}$, für die $|x-5|+5 = x$ *nicht* gilt?

Betragsgleichungen lösen

Kommt in einer Gleichung oder Ungleichung ein Betrag vor, führen wir eine Fallunterscheidung durch. Um die Gleichung $|x-5| = 2$ über der Grundmenge $\mathbb{R}$ zu lösen, unterscheiden wir 2 Fälle:

- **Fall 1:** Wenn $x-5 \geq 0$, also $x \geq 5$ gilt, dann folgt: $|x-5| = \boxed{}$
- **Fall 2:** Wenn $x-5 < 0$, also $x < 5$ gilt, dann folgt: $|x-5| = \boxed{}$

Fall 1: Wir untersuchen nur Zahlen $x \geq 5$.

$$\begin{aligned} x-5 &= 2 \quad |+5 \\ x &= 7 \end{aligned}$$

Die Zahl $x = 7$ ist unter den Zahlen $x \geq 5$.



Also ist $x = 7$ eine Lösung.

Fall 2: Wir untersuchen nur Zahlen $x < 5$.

$$\begin{aligned} -(x-5) &= 2 \\ -x+5 &= 2 \quad |+x-2 \\ 3 &= x \end{aligned}$$

Die Zahl $x = 3$ ist unter den Zahlen $x < 5$.



Also ist $x = 3$ eine Lösung.

Für die Lösungsmenge L dieser Gleichung gilt also: $L = \{3; 7\}$

Abstandsberechnung

Erkläre anhand der beiden Bilder, warum $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$ der **Abstand von** $\boldsymbol{a}$ **zu** $\boldsymbol{b}$ auf der Zahlengerade ist.

Fall 1: $a \geq b \implies |a-b| = \boxed{\quad}$

Fall 2: $a < b \implies |a-b| = \boxed{\quad}$



Welche Lösungen hat also die Gleichung $|x-5| = 2$ über der Grundmenge $\mathbb{R}$?

Fall ohne Lösung

Wir lösen die Gleichung $|4-2\cdot x| = 20-3\cdot|x+3|$ über der Grundmenge $\mathbb{R}$.

Für welche Zahlen x gilt $4-2\cdot x \geq 0$?

Für welche Zahlen x gilt $x+3 \geq 0$?

Um alle Lösungen zu ermitteln, teilen wir $\mathbb{R}$ in die 3 Intervalle $]-\infty;-3[$, $[-3;2]$ und $]2;\infty[$ auf:

Fall 1: $x < -3 \implies |4-2\cdot x| = \boxed{\quad}$ bzw. $|x+3| = \boxed{\quad}$

$$4-2\cdot x = 20+3\cdot(x+3)$$

$\boxed{\quad} = \boxed{\quad}$

$\boxed{\quad} = \boxed{\quad}$

$\boxed{\quad} = \boxed{\quad}$



Die Zahl $x = -5$ befindet sich unter den Zahlen $x < -3$. Also ist $x = -5$ eine Lösung.

Fall 2: $-3 \leq x \leq 2 \implies |4-2\cdot x| = \boxed{\quad}$ bzw. $|x+3| = \boxed{\quad}$

$$4-2\cdot x = 20-3\cdot(x+3)$$

$\boxed{\quad} = \boxed{\quad}$

$\boxed{\quad} = \boxed{\quad}$



Die Zahl $x = 7$ befindet sich *nicht* unter den Zahlen $-3 \leq x \leq 2$. In diesem Fall gibt es *keine* Lösung.

Fall 3: $x > 2 \implies |4-2\cdot x| = \boxed{\quad}$ bzw. $|x+3| = \boxed{\quad}$

$$-(4-2\cdot x) = 20-3\cdot(x+3)$$

$\boxed{\quad} = \boxed{\quad}$

$\boxed{\quad} = \boxed{\quad}$

$\boxed{\quad} = \boxed{\quad}$



Die Zahl $x = 3$ befindet sich unter den Zahlen $x > 2$. Also ist $x = 3$ eine Lösung.

Für die Lösungsmenge L dieser Gleichung gilt also: $L = \boxed{\quad}$

Betragsungleichungen lösen

Wir lösen die Ungleichung $|x+2| > 4$ über der Grundmenge $\mathbb{R}$.

- **Fall 1:** Wenn $x+2 \geq 0$, also $x \geq -2$ gilt, dann folgt: $|x+2| =$ ______
- **Fall 2:** Wenn $x+2 < 0$, also $x < -2$ gilt, dann folgt: $|x+2| =$ ______

Fall 1: Wir untersuchen nur Zahlen $x \geq -2$.

$$x + 2 > 4 \quad | -2$$
$$x > 2$$

Unter den Zahlen $x \geq -2$ sind alle Zahlen $x > 2$ Lösungen.



Also sind alle Zahlen $x > 2$ Lösungen.

Fall 2: Wir untersuchen nur Zahlen $x < -2$.

$$-(x+2) > 4$$
$$-x - 2 > 4 \quad | +x-4$$
$$-6 > x$$

Unter den Zahlen $x < -2$ sind alle Zahlen $x < -6$ Lösungen.



Also sind alle Zahlen $x < -6$ Lösungen.

Für die Lösungsmenge L dieser Ungleichung gilt also: $L =]-\infty; -6[\ \cup \ ]2; \infty[$

Deute $|x+2| = |x-(-2)|$ als Abstandsberechnung. Kannst du damit diese Ungleichung auch im Kopf lösen?

Fall ohne Lösung

Wir lösen die Ungleichung $|x-2| + |2 \cdot x + 3| \leq 5$ über der Grundmenge $\mathbb{R}$.

- Es gilt $x - 2 \geq 0$ genau dann, wenn $x \geq 2$.
- Es gilt $2 \cdot x + 3 \geq 0$ genau dann, wenn $x \geq -\frac{3}{2}$.

Um alle Lösungen zu ermitteln, teilen wir $\mathbb{R}$ in die 3 Intervalle $]-\infty; -\frac{3}{2}[$, $[-\frac{3}{2}; 2[$ und $[2; \infty[$ auf:

Fall 1: $x < -\frac{3}{2}$

$$-(x-2) - (2 \cdot x + 3) \leq 5 \iff -x + 2 - 2 \cdot x - 3 \leq 5 \iff -3 \cdot x \leq 6 \iff x \geq -2$$

Fall 2: $-\frac{3}{2} \leq x < 2$

$$-(x-2) + (2 \cdot x + 3) \leq 5 \iff -x + 2 + 2 \cdot x + 3 \leq 5 \iff x \leq 0$$

Fall 3: $x \geq 2$

$$(x-2) + (2 \cdot x + 3) \leq 5 \iff 3 \cdot x + 1 \leq 5 \iff x \leq \frac{4}{3}$$

Ermittle für jeden der 3 Fälle die Lösungsmenge (L_1, L_2 bzw. L_3):







$\implies L_1 =$ ______ $\qquad \implies L_2 =$ ______ $\qquad \implies L_3 =$ ______ $= \emptyset$

Für die Lösungsmenge L dieser Ungleichung gilt also: $L =$ ______

3 Fälle

Löse die Ungleichung $|2 - 3 \cdot x| + |x + 1| \leq 9$ über der Grundmenge $\mathbb{R}$.