

Fundamentalsatz der Arithmetik



Als Kinder lernen wir – so oder so ähnlich wie im Bild rechts dargestellt – die Primfaktorzerlegung.

84	2
42	2
21	3
7	7
1	

→ $84 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7$

Tatsächlich steckt hinter dieser Methode der **Fundamentalsatz der Arithmetik**:

- 1) Existenz der Primfaktorzerlegung: Jede natürliche Zahl $n \geq 2$ ist ein Produkt von Primzahlen.
- 2) Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung: Diese Primfaktorzerlegung ist für jede natürliche Zahl $n \geq 2$ eindeutig bis auf die Reihenfolge der Faktoren.

Jedes Produkt von Primzahlen, das *nicht* genau aus den vier Faktoren 2, 2, 3 und 7 besteht, ist also *ungleich* 84.

Einen Beweis für den Fundamentalsatz der Arithmetik findest du am Ende dieses Arbeitsblatts.

Vielfachheiten



Meist sortieren wir die Primfaktoren aufsteigend und schreiben gleiche Primfaktoren als Potenz.

Zum Beispiel: $1176 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 7 = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 7^2$

Wir sagen auch: „Die **Vielfachheit** der Primzahl 2 in 1176 ist 3.“

Folge von Vielfachheiten



Die Primfaktorzerlegung jeder natürlichen Zahl $n \geq 1$ hat eine **Folge** (v_1, v_2, v_3, \dots) von Vielfachheiten:

$$n = 2^{v_1} \cdot 3^{v_2} \cdot 5^{v_3} \cdot 7^{v_4} \cdot 11^{v_5} \cdot 13^{v_6} \cdot \dots$$

v_i ist die Vielfachheit der i -ten Primzahl.

Die Vielfachheiten sind ganze Zahlen $v_i \geq 0$, wobei nur *endlich* viele $v_i \neq 0$ sind.

Zum Beispiel: $1176 = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^0 \cdot 7^2 \cdot 11^0 \cdot 13^0 \cdot \dots \implies (v_n) = (3, 1, 0, 2, 0, 0, \dots)$

Umgekehrt liefert jede solche Folge die Primfaktorzerlegung einer natürlichen Zahl:

$$(v_n) = (3, 1, 0, 2, 0, 0, \dots) \implies 2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^0 \cdot 7^2 \cdot 11^0 \cdot 13^0 \cdot \dots = 1176$$

Wir schreiben dafür auch kurz: $1176 \cong (3, 1, 0, 2, 0, 0, \dots)$

Codierung & Decodierung



a) Zerlege 1400 in Primfaktoren. Gib die zugehörige Folge von Vielfachheiten an.

b) Welche natürliche Zahl steckt hinter der Folge $(0, 4, 2, 0, 0, \dots)$ von Vielfachheiten?

Vielfachheiten & Multiplikation



Die natürliche Zahl $a \geq 1$ hat die Folge von Vielfachheiten (v_1, v_2, v_3, \dots) .

$$a \cong (v_1, v_2, v_3, \dots)$$

Die natürliche Zahl $b \geq 1$ hat die Folge von Vielfachheiten (w_1, w_2, w_3, \dots) .

$$b \cong (w_1, w_2, w_3, \dots)$$

Welche Folge von Vielfachheiten hat dann die Zahl $a \cdot b$?

Vielfachheiten & Teilbarkeit



Es gilt $a \cong (v_1, v_2, v_3, \dots)$ und $b \cong (w_1, w_2, w_3, \dots)$.

Mit den beiden Folgen von Vielfachheiten können wir unmittelbar prüfen, ob a ein Teiler von b ist:

$$a \mid b \iff v_1 \leq w_1 \text{ und } v_2 \leq w_2 \text{ und } v_3 \leq w_3 \text{ und } \dots$$

In diesem Fall gibt es eine natürliche Zahl k mit $b = a \cdot k$. Welche Folge von Vielfachheiten hat k ?

Vielfachheiten & ggT/kgV



Ermittle die Primfaktorzerlegung vom ggT(a, b) und vom kgV(a, b).

a) $a = 2^3 \cdot 3^5 \cdot 7^1$, $b = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^4$

b) $a = 3^5 \cdot 11^2$, $b = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^4$

ggT(a, b) =

ggT(a, b) =

kgV(a, b) =

kgV(a, b) =

Vielfachheiten & ggT/kgV



Es gilt $a \cong (v_1, v_2, v_3, \dots)$ und $b \cong (w_1, w_2, w_3, \dots)$.

Mit den beiden Folgen können wir also ggT(a, b) und kgV(a, b) unmittelbar berechnen:

1) $\text{ggT}(a, b) \cong (\min\{v_1, w_1\}, \min\{v_2, w_2\}, \min\{v_3, w_3\}, \dots)$

2) $\text{kgV}(a, b) \cong (\max\{v_1, w_1\}, \max\{v_2, w_2\}, \max\{v_3, w_3\}, \dots)$

$\min\{v_1, w_1\}$ ist die kleinere der beiden Zahlen. („Minimum“). $\max\{v_1, w_1\}$ ist die größere der beiden Zahlen. („Maximum“)

$$\text{ggT}(a, b) \cdot \text{kgV}(a, b) = a \cdot b$$



Erkläre, warum $\text{ggT}(a, b) \cdot \text{kgV}(a, b) = a \cdot b$ gilt.

Vielfachheiten & Teilerfremdheit



Es gilt $a \cong (v_1, v_2, v_3, \dots)$ und $b \cong (w_1, w_2, w_3, \dots)$.

Wie kannst du mit den beiden Folgen unmittelbar prüfen, ob a und b teilerfremd sind?

Teilerfremd heißt, dass a und b keinen gemeinsamen Teiler außer 1 haben, also $\text{ggT}(a, b) = 1$.

Gemeinsame Faktoren kürzen



Erkläre, warum die beiden Zahlen $\frac{a}{\text{ggT}(a,b)}$ und $\frac{b}{\text{ggT}(a,b)}$ teilerfremd sind.

Wo sind die Primfaktoren?



Begründe die folgende Aussage: $\left. \begin{array}{l} n \mid a \cdot b \\ \text{ggT}(n, a) = 1 \end{array} \right\} \implies n \mid b$

Division



Begründe die folgenden beiden Äquivalenzen:

$$a \mid b \cdot c \stackrel{1)}{\iff} \frac{a}{\text{ggT}(a,b)} \mid \frac{b}{\text{ggT}(a,b)} \cdot c \stackrel{2)}{\iff} \frac{a}{\text{ggT}(a,b)} \mid c$$

Diese Eigenschaft wird sich am [Arbeitsblatt – Kongruenz und Restklassen](#) als nützlich erweisen.

Lemma von Euklid



Das **Lemma von Euklid** ist eine grundlegende Aussage der Zahlentheorie:

„Wenn eine Primzahl ein Produkt von zwei Zahlen teilt, dann teilt sie mindestens einen der Faktoren.“

$$p \mid a \cdot b \implies p \mid a \text{ oder } p \mid b \text{ für alle Primzahlen } p \text{ und } a, b \in \mathbb{Z}$$

Das Lemma von Euklid gilt dann auch für Produkte mit endlich vielen Faktoren:

$$p \mid a \cdot \underbrace{(b \cdot c)}_{\in \mathbb{Z}} \implies p \mid a \text{ oder } p \mid b \cdot c \implies p \mid a \text{ oder } p \mid b \text{ oder } p \mid c$$

„Wenn eine Primzahl p ein Produkt teilt, dann teilt p mindestens einen der Faktoren.“

Lemma von Euklid (Beweis)



Wir beweisen das **Lemma von Euklid** ohne die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung zu verwenden. Tatsächlich ist die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung eine Folgerung aus dem Lemma von Euklid.

Warum folgt also aus $p \mid a \cdot b$, dass die Primzahl p eine der Zahlen a oder b teilen muss?

Wenn p ein Teiler von a ist, dann ist nichts mehr zu begründen.

Wenn p kein Teiler von a ist, dann gilt $\text{ggT}(p, a) = 1$, da p eine Primzahl ist.

- 1) Der **Euklidische Algorithmus** liefert ganze Zahlen r und s , für die gilt: $p \cdot r + a \cdot s = \underbrace{\text{ggT}(p, a)}_{=1}$
- 2) Wir multiplizieren mit b auf beiden Seiten der Gleichung: $p \cdot r \cdot b + a \cdot b \cdot s = b$
- 3) Da p ein Teiler von $a \cdot b$ gibt es eine ganze Zahl k mit $a \cdot b = k \cdot p$.

Wir setzen ein: $p \cdot r \cdot b + k \cdot p \cdot s = b \implies p \cdot \underbrace{(r \cdot b + k \cdot s)}_{\in \mathbb{Z}} = b$

Wenn p kein Teiler von a ist, dann muss also p ein Teiler von b sein.

Existenz der Primfaktorzerlegung (Beweis)



Warum kann jede natürliche Zahl $n \geq 2$ als Produkt von Primfaktoren geschrieben werden?

Indirekter Beweis: Angenommen, es gibt eine natürliche Zahl ≥ 2 , die *keine* Primfaktorzerlegung hat.

- 1) Wähle unter allen solchen Zahlen die *kleinste* Zahl m , die *keine* Primfaktorzerlegung (PFZ) hat.
- 2) Dann kann m keine Primzahl sein. Denn jede Primzahl hat eine PFZ, nämlich sich selbst.
- 3) Also gibt es natürliche Zahlen a und b mit $m = a \cdot b$ und $1 < a, b < m$. Sonst wäre m eine Primzahl.
- 4) Dann müssen aber a und b jeweils eine PFZ haben. m ist ja die *kleinste* Zahl ≥ 2 ohne PFZ.
- 5) Dann hat aber auch m eine PFZ: $m = a \cdot b = \underbrace{(\text{PFZ von } a) \cdot (\text{PFZ von } b)}_{\text{PFZ von } m} \nexists$ Widerspruch zu 1)

Die Annahme war also falsch. *Jede* natürliche Zahl $n \geq 2$ muss eine Primfaktorzerlegung haben.

Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung (Beweis)



Warum ist die PFZ jeder natürlichen Zahl $n \geq 2$ eindeutig bis auf die Reihenfolge der Faktoren?

Indirekter Beweis: Angenommen, es gibt eine natürliche Zahl ≥ 2 mit verschiedenen PFZ.

- 1) Wähle unter allen solchen Zahlen die *kleinste* Zahl m , die verschiedene PFZ hat:

$$m = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_r = P_1 \cdot P_2 \cdot \dots \cdot P_s$$

- 2) Dann kann m keine Primzahl sein. Denn jede Primzahl hat eine *eindeutige* PFZ, nämlich sich selbst.
Beide Zerlegungen haben also mindestens zwei Primfaktoren: $r, s \geq 2$
- 3) Es kann keine Primzahl in beiden Zerlegungen vorkommen.
Wenn eine Primzahl p in beiden Zerlegungen vorkommt, dann ist $\frac{m}{p}$ eine *kleinere* Zahl als m , die verschiedene PFZ hat. \nexists
- 4) $p_1 \mid m \implies p_1 \mid P_1 \cdot P_2 \cdot \dots \cdot P_s \implies p_1 \mid P_1$ oder $p_1 \mid P_2$ oder \dots oder $p_1 \mid P_s$ Lemma von Euklid
- 5) Wenn eine Primzahl eine Primzahl teilt, dann sind sie gleich. Sonst wäre die größere Zahl keine Primzahl.
- 6) Die Primzahl p_1 kommt also in beiden PFZ vor. \nexists Widerspruch zu 3)

Die Annahme war also falsch.

Die PFZ *jeder* natürlichen Zahl $n \geq 2$ muss bis auf die Reihenfolge der Faktoren eindeutig sein.

