




Die Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ mit $a_n = 2^n$ ist streng monoton wachsend. Es gilt also $a_{n+1} > a_n$ für alle $n \geq 1$.

1) Berechne die ersten 5 Folgenglieder:

$$a_1 = \boxed{} \quad a_2 = \boxed{} \quad a_3 = \boxed{} \quad a_4 = \boxed{} \quad a_5 = \boxed{}$$

2) Ab dem wievielten Folgenglied sind alle Folgenglieder größer als 400?



Tatsächlich wächst die Folge (a_n) unbeschränkt gegen unendlich (∞), das heißt:


Zu jeder noch so großen Zahl M gibt es ein Folgenglied, ab dem *alle* Glieder größer als M sind.

Wir schreiben dafür: $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = \infty$ oder kurz $2^n \rightarrow \infty$

„limit“ ist englisch für Grenze.



Du nimmst an einem Sommertag in forschender Absicht ein Getränk aus dem Kühlschrank und stellst es auf den Küchentisch. Alle 5 Minuten misst du die Temperatur des Getränks:




Die Folge der Messwerte $(T_1, T_2, T_3, \dots)$ ist streng monoton wachsend.

Die Temperatur wird aber *nicht* unbeschränkt groß.



Die Folge $(T_n)_{n \geq 1}$ mit $T_n = 25 - 19 \cdot e^{-0,0584 \cdot (n-1)}$ ist streng monoton wachsend.



1) Berechne die angegebenen Folgenglieder.

$$\begin{array}{ll} T_{10} = \boxed{} & T_{100} = \boxed{} \\ T_{30} = \boxed{} & T_{300} = \boxed{} \end{array}$$

2) Begründe, warum $T_n < 25$ für alle $n \geq 1$ gilt.


Tatsächlich hat die Folge (T_n) den Grenzwert 25.

Wir schreiben dafür: $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = 25$ oder kurz $T_n \rightarrow 25$



Die Folge $(a_n)_{n \geq 1} = \left(\frac{1}{1}; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \frac{1}{4}; \frac{1}{5}; \dots\right)$ mit $a_n = \frac{1}{n}$ ist streng monoton fallend.

Da Zähler und Nenner stets positiv sind, ist jedes Folgenglied größer als 0:



„0 ist eine untere Schranke der Folge.“

Ab dem wievielten Folgenglied sind alle Folgenglieder kleiner als 0,001?


Tatsächlich ist die Zahl 0 der Grenzwert dieser Folge: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ oder kurz $\frac{1}{n} \rightarrow 0$




Auch Folgen, die *nicht* monoton sind, können einen Grenzwert haben.

Das rechts dargestellte Pendel schwingt hin und her.

Jeder Schwung dauert eine Sekunde.



Die maximale Auslenkung aus der Ruheposition nimmt mit jedem Schwung betragsmäßig ab. Reibung



Dabei gilt: $x(t) = e^{-0.25 \cdot t} \cdot \cos(\pi \cdot t)$

$t \dots$ Zeit in Sekunden

$x(t) \dots$ horizontale Auslenkung in dm

Links siehst du den Graphen dieser Funktion.

Berechne die folgenden Funktionswerte.

Beachte, dass die Winkel im Bogenmaß sind.

$$\begin{array}{lll} x_0 = x(0) = \boxed{} & x_1 = x(1) = \boxed{} & x_2 = x(2) = \boxed{} \\ x_3 = x(3) = \boxed{} & x_4 = x(4) = \boxed{} & x_5 = x(5) = \boxed{} \end{array}$$

Tatsächlich gilt: $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-0.25 \cdot n} \cdot \cos(\pi \cdot n) = 0$




Eine Folge *kann* ihren Grenzwert auch selbst enthalten.

Zum Beispiel: Die konstante Folge $(42; 42; 42; 42; \dots)$ hat den Grenzwert 42.



Wenn die Folge (a_n) den **Grenzwert** a hat, schreiben wir $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ bzw. $a_n \rightarrow a$ und meinen damit ganz genau das Folgende:

„Zu jedem Intervall $]a - \varepsilon; a + \varepsilon[$ finden wir ein Folgenglied, ab dem dann **alle** Folgenglieder in diesem Intervall liegen.“



Das muss für jede noch so kleine *positive* Zahl ε gelten.

Das Intervall $]a - \varepsilon; a + \varepsilon[$ nennt man dann auch ε -Umgebung von a .

Mehr dazu findest du am [AB – Grenzwert von Folgen II](#).

Geometrische Folge – Grenzwert



Das Verhalten der **geometrischen Folge** $(q^n)_{n \geq 1}$ hängt vom Wert der Basis q ab.

Berechne jeweils die ersten 4 Folgenglieder:

1) $q = 2$:

4) $q = -2$:

2) $q = 1$:


5) $q = -1$:

3) $q = 0,5$:

6) $q = -0,5$:

Allgemein gilt:

- Wenn $-1 < q < 1$, dann $q^n \rightarrow 0$.
- Wenn $q = 1$, dann $q^n \rightarrow 1$.
- Wenn $q > 1$, dann $q^n \rightarrow \infty$.
- Wenn $q \leq -1$, dann hat (q^n) *keinen* Grenzwert.



Mehr dazu findest du am [AB – Grenzwert von Folgen II](#).

Geometrische Folge – Grenzwert



Hat die geometrische Folge einen Grenzwert für $n \rightarrow \infty$? Wenn ja, welchen?

a) (a_n) mit $a_n = e^{0,1 \cdot n}$

d) (d_n) mit $d_n = 2^{-n}$

b) (b_n) mit $b_n = e^{-8 \cdot n}$

e) (e_n) mit $e_n = (-2)^n$

c) (c_n) mit $c_n = \frac{1}{2^n}$

f) (f_n) mit $f_n = 0,8^{-n}$

Grenzwertsätze



Wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ gilt, dann gilt außerdem:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = a - b$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$ $b_n \neq 0, b \neq 0$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(a)$, wenn f eine **stetige** Funktion ist und alle a_n und a in der Definitionsmenge von f sind.

Die elementaren Funktionen sind – überall dort, wo sie definiert sind – stetig.
Zum Beispiel:

i) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = a^2$

iv) $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(a_n) = \ln(a)$

ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{a_n} = \sqrt{a}$

v) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(a_n) = \sin(a)$

iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{a_n} = 2^a$

vi) $\lim_{n \rightarrow \infty} \arccos(a_n) = \arccos(a)$

Grenzwertsätze



Wir ermitteln den Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{16 - \frac{1}{n^2} + 0,42^n}$ mit den **Grenzwertsätzen**:

1) Wir wissen bereits, dass $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ gilt. Deshalb gilt auch: $\frac{1}{n^2} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} \rightarrow 0 \cdot 0 = 0$

2) Da 0,42 betragsmäßig kleiner als 1 ist, gilt $0,42^n \rightarrow 0$.

3) Wir setzen diese Bausteine zusammen: $\sqrt{16 - \frac{1}{n^2} + 0,42^n} \rightarrow \sqrt{16 - 0 + 0} = \sqrt{16} = 4$



Ermittle den Grenzwert der Folge für $n \rightarrow \infty$.

a) $a_n = \left(5 + \frac{3}{n}\right)^2$


b) $b_n = 4 \cdot \cos\left(\frac{3}{n}\right) - 2 \cdot \sin\left(\frac{1}{n^2}\right)$

c) $c_n = \frac{4 \cdot n^3 - 2 \cdot n + 3}{5 \cdot n^3 - n^2 - 1}$

Hinweis: Hebe im Zähler und im Nenner jeweils n^3 heraus und kürze.

d) $d_n = \frac{-3 \cdot n^2 + 5}{2 \cdot n^3 + n^2 - 3}$

Hinweis: Hebe im Zähler n^2 und im Nenner n^3 heraus und kürze.



Ein Meter bleibt ein Meter.



Wir nehmen einen Papierstreifen mit 1 Meter Länge.


Wir teilen ihn genau in der Mitte.

Dann nehmen wir eine Hälfte und teilen sie wieder in der Mitte.

Und so machen wir immer weiter.

Die Gesamtlänge dieser potentiell unendlich vielen Papierschnitzel verändert sich dabei *nicht*.

Intuitiv gilt deshalb: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \frac{1}{128} + \dots = 1$



Unendliche geometrische Reihe



Wenn $(b_n)_{n \geq 1}$ eine **geometrische Folge** mit Quotient q ist, dann gilt die folgende Summenformel:

$$s_n = b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_n = b_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Wenn $|q| < 1$ gilt, dann können wir die Summe aller unendlich vielen Folgenglieder berechnen:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = b_1 + b_2 + b_3 + \dots = \frac{b_1}{1 - q}$$

Siehst du, warum dieser Grenzwert aus der Summenformel folgt?

Unendliche geometrische Reihe



Ermittle den Quotienten q der gegebenen geometrischen Folge.

Berechne damit die Summe *aller* unendlich vielen Folgenglieder.

a) $(a_n) = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}; \dots\right) \Rightarrow q = \boxed{} \Rightarrow \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = \boxed{}$

b) $(b_n) = (25; 20; 16; \dots) \Rightarrow q = \boxed{} \Rightarrow 25 + 20 + 16 + \dots = \boxed{}$

c) $(c_n) = (100; -10; 1; -0,1; \dots) \Rightarrow q = \boxed{} \Rightarrow 100 - 10 + 1 - 0,1 + \dots = \boxed{}$