


Maximale Steigung berechnen



MmF

Der dargestellte Funktionsgraph modelliert das Profil eines Hügels:

- Wo ist der tiefste Punkt?
- Wo ist der höchste Punkt?
- Wie misst man die Steigung in einem Punkt?
- Wo geht es am steilsten bergauf?



Am [Arbeitsblatt – Kurvenuntersuchungen I](#) und [Arbeitsblatt – Differentialquotient](#) beantworten wir die ersten drei Fragen. Auf diesem Arbeitsblatt beantworten wir die letzte Frage.

2. Ableitung



MmF

$f'$  ist die **Ableitungsfunktion** von  $f$ . Wir sagen auch kurz: „ $f'$  ist die Ableitung von  $f$ .“

Die Ableitung von  $f'$  – also  $(f')'$  – heißt **2. Ableitung von  $f$** . Wir schreiben dafür kurz  $f''$ .

Monotonieverhalten von  $f'$






MmF

Das **Monotonieverhalten** der Funktion  $f$  können wir mithilfe des Vorzeichens von  $f'$  untersuchen.

Das Monotonieverhalten der Funktion  $f'$  können wir also mithilfe des Vorzeichens von  $f''$  untersuchen.

Der Graph einer **kubischen** Funktion  $f$  ist dargestellt:



- 1) Skizziere den Graphen der **quadratischen** Funktion  $f'$ .

Wo sind die Nullstellen von  $f'$ ? Wo ist die Scheitelstelle?

Ist die Parabel nach unten oder nach oben geöffnet?

- 2) Skizziere den Graphen der **linearen** Funktion  $f''$ .


Krümmungsverhalten



MmF

Mithilfe der zweiten Ableitung  $f''$  können wir das **Krümmungsverhalten** von  $f$  untersuchen:

- 1) Wenn  $f''(x) > 0$  für alle Stellen  $x$  eines Intervalls gilt, dann ist  $f'$  streng monoton steigend in diesem Intervall. Die Steigung von  $f$  wird in diesem Intervall also immer größer.



Wir sagen auch:


Der Graph von  $f$  ist **positiv gekrümmt**.

Der Graph von  $f$  ist **linksgekrümmt**.

Ist der Graph eine Straße in Vogelperspektive, dann fahren wir eine Linkskurve.



- 2) Wenn  $f''(x) < 0$  für alle Stellen  $x$  eines Intervalls gilt, dann ist  $f'$  streng monoton fallend in diesem Intervall. Die Steigung von  $f$  wird in diesem Intervall also immer kleiner.




Wir sagen auch:

Der Graph von  $f$  ist **negativ gekrümmt**.


Der Graph von  $f$  ist **rechtsgekrümmt**.

Ist der Graph eine Straße in Vogelperspektive, dann fahren wir eine Rechtskurve.




Funktionsgraph von  $f'' \rightsquigarrow$  Krümmungsverhalten von  $f$  

Rechts ist der Graph einer 2. Ableitungsfunktion  $f''$  dargestellt.  
Wir untersuchen das Krümmungsverhalten von  $f$ .




- Die Gleichung  $f''(x) = 0$  hat die drei Lösungen  $-2$ ,  $1$  und  $4$ . Die Funktion  $f''$  wechselt an diesen Stellen das Vorzeichen. Die Funktion  $f$  wechselt an diesen Stellen ihr Krümmungsverhalten.
- Rechts ist der Graph von  $f$  dargestellt. Zeichne am Graphen alle Punkte ein, in denen  $f$  das Krümmungsverhalten wechselt.



- Trage in die Kästchen ein, ob  $f$  im angegebenen Intervall positiv gekrümmt ( $\cup$ ) oder negativ gekrümmt ( $\cap$ ) ist.  
 $]-\infty; -2[$   $\cup$      $]-2; 1[$   $\cap$      $]1; 4[$   $\cup$      $]4; \infty[$   $\cap$


Wendestellen & Wendepunkte 

Rechts sind der Graph einer Funktion  $f$ ,  
der Graph ihrer Ableitungsfunktion  $f'$   
und der Graph ihrer 2. Ableitungsfunktion  $f''$  dargestellt.  
An den Stellen  $x_1$  und  $x_2$  wechselt die Funktion  $f''$  das Vorzeichen.  
Daraus folgt, dass ...



- ... die Funktion  $f'$  dort das Monotonieverhalten wechselt.
  - ... die Funktion  $f$  dort das Krümmungsverhalten wechselt.
- Diese Stellen  $x_1$  und  $x_2$  heißen **Wendestellen** von  $f$ .  
Die zugehörigen Punkte  $W_1$  und  $W_2$  am Funktionsgraphen von  $f$  heißen **Wendepunkte** von  $f$ .


Im Punkt  $W_1$  hat die Steigung von  $f$  ein lokales Minimum.  
Lokal geht es dort also am steilsten bergab.  
Im Punkt  $W_2$  hat die Steigung von  $f$  ein lokales Maximum.  
Lokal geht es dort also am steilsten bergauf.

Maximale Steigung 

Die Funktion  $f$  mit

$$f(x) = -\frac{3}{16} \cdot x^3 + \frac{63}{32} \cdot x^2 - \frac{297}{64} \cdot x + \frac{2217}{640}$$

modelliert das Profil rechts dargestellten Hügels.  
Berechne jene Stelle, an der der Hügel am stärksten ansteigt.




$$f'(x) = -\frac{9}{16} \cdot x^2 + \frac{63}{16} \cdot x - \frac{297}{64}$$

$$f''(x) = -\frac{9}{8} \cdot x + \frac{63}{16}$$


$$f''(x) = 0 \iff \frac{63}{16} = \frac{9}{8} \cdot x \iff x = 3,5$$

Der Anstieg ist an der Stelle  $x = 3,5$  maximal.

Hinreichende Bedingung für Extremstellen



Im Bild links gilt  $f'(x_0) = 0$  und  $f''(x_0) > 0$ .  
 Dann wechselt  $f'$  das Vorzeichen von  $-$  auf  $+$ .  
 Also hat  $f$  an der Stelle  $x_0$  ein lokales **Minimum**.



Im Bild rechts gilt  $g'(x_0) = 0$  und  $g''(x_0) < 0$ .  
 Dann wechselt  $g'$  das Vorzeichen von  $+$  auf  $-$ .  
 Also hat  $g$  an der Stelle  $x_0$  ein lokales **Maximum**.

Hinreichende Bedingung für Extremstellen



Die Funktion  $f$  mit  $f(x) = x \cdot \ln(x)$  ist für alle  $x > 0$  definiert.

- 1) Zeige mit den **Ableitungsregeln**, dass  $f'(x) = \ln(x) + 1$  und  $f''(x) = \frac{1}{x}$  gilt.
- 2) Ermittle die Nullstelle von  $f'$ . Zeige mithilfe von  $f''$ , dass  $f$  dort ein lokales Minimum hat.

1)  $f'(x) = 1 \cdot \ln(x) + x \cdot \frac{1}{x} = \ln(x) + 1$  (Produktregel)

$f''(x) = \frac{1}{x}$

2)  $f'(x) = 0 \iff \ln(x) = -1 \iff x = e^{-1} = 0,367\dots$

$f''(e^{-1}) = e = 2,71\dots > 0$


$f$  hat also ein lokales Minimum an der Stelle  $x = e^{-1}$ .

Hinreichend, aber nicht notwendig




Für eine Funktion  $f$  gilt  $f'(x_0) = 0$  und  $f''(x_0) = 0$ . Dann *kann*  $f$  an dieser Stelle  $x_0 \dots$   
 ... einen **Sattelpunkt** haben:      ... einen **Tiefpunkt** haben:      ... einen **Hochpunkt** haben:


$f(x) = x^3$   
 $f'(x) = 3 \cdot x^2$   
 $f''(x) = 6 \cdot x$   
 $f'(0) = f''(0) = 0$



$f(x) = x^4$   
 $f'(x) = 4 \cdot x^3$   
 $f''(x) = 12 \cdot x^2$   
 $f'(0) = f''(0) = 0$



$f(x) = -x^4$   
 $f'(x) = -4 \cdot x^3$   
 $f''(x) = -12 \cdot x^2$   
 $f'(0) = f''(0) = 0$



Höhere Ableitungen







Wenn auch  $f''$  **differenzierbar** ist, dann schreiben wir für deren Ableitung  $f'''$  und sprechen von der **3. Ableitung von  $f$** . Genauso können wir uns auch noch höhere Ableitungen einer Funktion ansehen. Zur besseren Lesbarkeit schreiben wir dann aber zum Beispiel  $f^{(42)}$  für die 42. Ableitung von  $f$ .

Hinreichende Bedingung für Wendestellen



Wenn  $f''(x_1) = 0$  und  $f'''(x_1) > 0$  gilt,  
dann wechselt  $f''$  an der Stelle  $x_1$  das Vorzeichen von  $-$  auf  $+$ .  
Also ist  $x_1$  eine **Wendestelle von  $f$**  und  
das Krümmungsverhalten wechselt dort von  $\curvearrowright$  auf  $\curvearrowleft$ .

Wenn  $f''(x_2) = 0$  und  $f'''(x_2) < 0$  gilt,  
dann folgt genauso, dass  $f$  an der **Wendestelle  $x_2$**   
das Krümmungsverhalten von  $\curvearrowleft$  auf  $\curvearrowright$  wechselt.




Kurvenuntersuchung



Für die **Polynomfunktion  $f$**  gilt:  $f(x) = \frac{1}{12} \cdot x^3 - \frac{1}{4} \cdot x^2 - 2 \cdot x + \frac{17}{3}$

- 1) Ermittle jeweils eine Funktionsgleichung von  $f'$ ,  $f''$  und  $f'''$ .
- 2) Berechne die Extrempunkte von  $f$ .  
Ermittle das Monotonieverhalten von  $f$ .
- 3) Berechne den Wendepunkt von  $f$ .  
Ermittle das Krümmungsverhalten von  $f$ .
- 4) Rechts sind die 3 Nullstellen von  $f$  eingezeichnet.  
Zeichne die Extrempunkte von  $f$  ein.  
Zeichne den Wendepunkt von  $f$  ein.  
Skizziere den Funktionsgraphen von  $f$ .



1)  $f'(x) = \frac{1}{4} \cdot x^2 - \frac{1}{2} \cdot x - 2 \implies f''(x) = \frac{1}{2} \cdot x - \frac{1}{2} \implies f'''(x) = \frac{1}{2}$

2)  $f'(x) = 0 \iff x_1 = -2, x_2 = 4$

$f(-2) = 8, f''(-2) = -\frac{3}{2} < 0 \implies$  Hochpunkt:  $H = (-2 | 8)$

$f(4) = -1, f''(4) = \frac{3}{2} > 0 \implies$  Tiefpunkt:  $T = (4 | -1)$

Monotonieverhalten:  $]-\infty; -2[ \nearrow \quad ]-2; 4[ \searrow \quad ]4; \infty[ \nearrow$

3)  $f''(x) = 0 \iff x = 1$

$f(1) = \frac{7}{2}, f'''(1) = \frac{1}{2} > 0 \implies$  Wendepunkt:  $W = (1 | \frac{7}{2})$



Krümmungswechsel von  $\curvearrowright$  auf  $\curvearrowleft$

Krümmungsverhalten:  $]-\infty; 1[ \curvearrowright \quad ]1; \infty[ \curvearrowleft$

Die **Tangente** in einem Wendepunkt nennen wir auch **Wendetangente**.

Die Wendetangente durchbohrt im Wendepunkt den Funktionsgraphen von  $f$ .


Lokal verläuft die Wendetangente auf der einen Seite oberhalb vom Funktionsgraphen von  $f$  und auf der anderen Seite unterhalb.



Wenn die Wendetangente waagrecht ist, dann ist der Wendepunkt gleichzeitig ein Sattelpunkt von  $f$ .

Für die Polynomfunktion  $f$  gilt:  $f(x) = -\frac{5}{32} \cdot x^3 + \frac{15}{8} \cdot x^2 - \frac{9}{2} \cdot x$

- 1) Berechne den Wendepunkt  $W$ .
- 2) Ermittle eine Gleichung der Wendetangente.



$$1) f'(x) = -\frac{15}{32} \cdot x^2 + \frac{15}{4} \cdot x - \frac{9}{2} \implies f''(x) = -\frac{15}{16} \cdot x + \frac{15}{4}$$

$$f''(x) = 0 \iff \frac{15}{16} \cdot x = \frac{15}{4} \iff x = 4$$

$$f(4) = 2 \implies W = (4 | 2)$$

$$2) y = k \cdot x + d$$

$$k = f'(4) = 3$$

$$d = y - k \cdot x = 2 - 3 \cdot 4 = -10$$

$$\text{Gleichung der Wendetangente: } y = 3 \cdot x - 10$$

Für die zweite Ableitung einer Funktion  $f$  gilt:  $f''(x) = x^2 \cdot (x - 5)$

- 1) Berechne die Nullstellen von  $f''$ .

$$f''(x) = 0 \iff x^2 \cdot (x - 5) = 0 \iff x = 0 \text{ oder } x = 5$$

- 2) Kreuze die zutreffenden Eigenschaften von  $f''$  und  $f$  an.

	$f''$	$f$
$x < 0$	<input type="checkbox"/> = 0 <input type="checkbox"/> > 0 <input checked="" type="checkbox"/> < 0	<input type="checkbox"/> ↗ <input checked="" type="checkbox"/> ↘
$x = 0$	<input checked="" type="checkbox"/> = 0 <input type="checkbox"/> > 0 <input type="checkbox"/> < 0	<input type="checkbox"/> Wendepunkt <input checked="" type="checkbox"/> kein Wendepunkt
$0 < x < 5$	<input type="checkbox"/> = 0 <input type="checkbox"/> > 0 <input checked="" type="checkbox"/> < 0	<input type="checkbox"/> ↗ <input checked="" type="checkbox"/> ↘
$x = 5$	<input checked="" type="checkbox"/> = 0 <input type="checkbox"/> > 0 <input type="checkbox"/> < 0	<input checked="" type="checkbox"/> Wendepunkt <input type="checkbox"/> kein Wendepunkt
$x > 5$	<input type="checkbox"/> = 0 <input checked="" type="checkbox"/> > 0 <input type="checkbox"/> < 0	<input checked="" type="checkbox"/> ↗ <input type="checkbox"/> ↘

Für die Funktion  $g$  gilt:  $g(x) = x \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$

1) Wir haben die ersten beiden Ableitungen von  $g$  berechnet und faktorisiert:

Rechne nach.

$$g'(x) = -(x+1) \cdot (x-1) \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$g''(x) = (x+\sqrt{3}) \cdot x \cdot (x-\sqrt{3}) \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$$

2) Berechne die Nullstelle von  $g$  und kreuze die zutreffenden Eigenschaften an.

$$g(x) = 0 \iff$$

$$x \cdot \underbrace{e^{-\frac{x^2}{2}}}_{>0} = 0 \iff x = 0$$

	$g$		
$x < 0$	<input type="checkbox"/> = 0	<input type="checkbox"/> > 0	<input checked="" type="checkbox"/> < 0
$x = 0$	<input checked="" type="checkbox"/> = 0	<input type="checkbox"/> > 0	<input type="checkbox"/> < 0
$x > 0$	<input type="checkbox"/> = 0	<input checked="" type="checkbox"/> > 0	<input type="checkbox"/> < 0

3) Berechne die Nullstellen von  $g'$  und kreuze die zutreffenden Eigenschaften an.

$$g'(x) = 0 \iff x = -1 \text{ oder } x = 1$$

	$g'$	$g$
$x < -1$	<input type="checkbox"/> = 0 <input type="checkbox"/> > 0 <input checked="" type="checkbox"/> < 0	<input type="checkbox"/> ↗ <input checked="" type="checkbox"/> ↘
$x = -1$	<input checked="" type="checkbox"/> = 0 <input type="checkbox"/> > 0 <input type="checkbox"/> < 0	<input type="checkbox"/> Hochpunkt <input checked="" type="checkbox"/> Tiefpunkt <input type="checkbox"/> Sattelpunkt
$-1 < x < 1$	<input type="checkbox"/> = 0 <input checked="" type="checkbox"/> > 0 <input type="checkbox"/> < 0	<input checked="" type="checkbox"/> ↗ <input type="checkbox"/> ↘
$x = 1$	<input checked="" type="checkbox"/> = 0 <input type="checkbox"/> > 0 <input type="checkbox"/> < 0	<input checked="" type="checkbox"/> Hochpunkt <input type="checkbox"/> Tiefpunkt <input type="checkbox"/> Sattelpunkt
$x > 1$	<input type="checkbox"/> = 0 <input type="checkbox"/> > 0 <input checked="" type="checkbox"/> < 0	<input type="checkbox"/> ↗ <input checked="" type="checkbox"/> ↘

4) Berechne die Nullstellen von  $g''$  und kreuze die zutreffenden Eigenschaften an.

$$g''(x) = 0 \iff x = -\sqrt{3} \text{ oder } x = 0 \text{ oder } x = \sqrt{3}$$

	$g''$	$g$
$x < -\sqrt{3}$	<input type="checkbox"/> = 0 <input type="checkbox"/> > 0 <input checked="" type="checkbox"/> < 0	<input type="checkbox"/> ↗ <input checked="" type="checkbox"/> ↘
$x = -\sqrt{3}$	<input checked="" type="checkbox"/> = 0 <input type="checkbox"/> > 0 <input type="checkbox"/> < 0	<input checked="" type="checkbox"/> Wendepunkt <input type="checkbox"/> kein Wendepunkt
$-\sqrt{3} < x < 0$	<input type="checkbox"/> = 0 <input checked="" type="checkbox"/> > 0 <input type="checkbox"/> < 0	<input checked="" type="checkbox"/> ↗ <input type="checkbox"/> ↘
$x = 0$	<input checked="" type="checkbox"/> = 0 <input type="checkbox"/> > 0 <input type="checkbox"/> < 0	<input checked="" type="checkbox"/> Wendepunkt <input type="checkbox"/> kein Wendepunkt
$0 < x < \sqrt{3}$	<input type="checkbox"/> = 0 <input type="checkbox"/> > 0 <input checked="" type="checkbox"/> < 0	<input type="checkbox"/> ↗ <input checked="" type="checkbox"/> ↘
$x = \sqrt{3}$	<input checked="" type="checkbox"/> = 0 <input type="checkbox"/> > 0 <input type="checkbox"/> < 0	<input checked="" type="checkbox"/> Wendepunkt <input type="checkbox"/> kein Wendepunkt
$x > \sqrt{3}$	<input type="checkbox"/> = 0 <input checked="" type="checkbox"/> > 0 <input type="checkbox"/> < 0	<input checked="" type="checkbox"/> ↗ <input type="checkbox"/> ↘

5) Der Funktionsgraph von  $g$  ist unten dargestellt. Kontrolliere deine Ergebnisse von 2), 3) und 4).

