



Erinnere dich, dass die Lösungen $(x | y)$ der Gleichung $y = k \cdot x + d$ auf einer **Gerade** liegen, nämlich auf jener Gerade mit **Steigung** k , die durch den Punkt $(0 | d)$ verläuft.


Die Lösungen der Gleichung

$$y = \frac{7}{4} \cdot x - 2$$

sind im Koordinatensystem rechts dargestellt.

Der Punkt $A = (3 | y_A)$ liegt auf dieser Gerade. Berechne y_A .

$$y_A = \frac{7}{4} \cdot 3 - 2 = \frac{21}{4} - \frac{8}{4} = \frac{13}{4} = 3,25$$



Zu jeder Stelle x gibt es *genau einen* Wert y so, dass der Punkt $(x | y)$ auf der Gerade liegt.

Wir können also die Gleichung $y = k \cdot x + d$ als Zuordnung – zu jedem x *genau ein* y – auffassen. Zur Verdeutlichung schreiben wir dann auch

$$y(x) = \frac{7}{4} \cdot x - 2 \quad \text{„}y \text{ von } x \text{ ist gleich } \dots \text{“}$$

und sprechen von einer **Funktionsgleichung**.

Lineare Funktion




Jede Funktion f mit $f(x) = k \cdot x + d$ heißt **lineare Funktion**.

Rechts ist der **Graph** einer linearen Funktion f dargestellt.

An jeder Stelle x gibt es *genau einen* zugehörigen Funktionswert $f(x)$.

Zum Beispiel:

x	0	2	4	6
$f(x)$	2	1	0	-1



Funktionsgraph → Funktionsgleichung



Rechts unten ist der Graph einer linearen Funktion f dargestellt.

Die Funktionsgleichung $f(x) = k \cdot x + d$ von f kannst du mit den folgenden Schritten aufstellen.


- 1) Suche 2 Punkte am Graphen, deren Koordinaten du exakt ablesen kannst.

Zeichne rechts das zugehörige **Steigungsdreieck** ein.

$$A = (-2 | 3) \quad B = (4 | -1)$$

- 2) Berechne die Steigung k als **Differenzenquotient**.

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-4}{6} = -\frac{2}{3}$$



- 3) Setze k und die Koordinaten $(x | f(x))$ einer der beiden Punkte in $f(x) = k \cdot x + d$ ein. Forme die Gleichung nach d um.

$$3 = -\frac{2}{3} \cdot (-2) + d \quad \implies \quad d = 3 - \frac{4}{3} = \frac{5}{3}$$

- 4) Schreibe als Endergebnis die Funktionsgleichung auf: $f(x) = -\frac{2}{3} \cdot x + \frac{5}{3}$


Funktionsgleichung → Funktionsgraph



Für die lineare Funktion g gilt: $g(t) = \frac{4}{7} \cdot t - 2$

Rechts ist ein Ausschnitt des Koordinatensystems dargestellt.

Welche 2 Punkte in diesem Ausschnitt haben ganzzahlige Koordinaten *und* liegen auf dem Funktionsgraphen von g ?



$$g(0) = -2 \implies (0 \mid -2) \quad g(7) = \frac{4}{7} \cdot 7 - 2 = 2 \implies (7 \mid 2)$$

Zeichne den Funktionsgraphen von g rechts ein.

Schnittpunkt mit senkrechter Achse



Rechts ist der Graph der linearen Funktion h mit


$$h(x) = k \cdot x + d$$

für $x \geq 2$ dargestellt. Ermittle d .

$$k = \frac{4}{1} = 4$$

Punkt $(2 \mid h(2))$ einsetzen und nach d umformen:

$$d = h(2) - k \cdot 2 = 3 - 4 \cdot 2 = -5$$



Temperatur



Temperaturen werden in verschiedenen Einheiten angegeben. Die Umrechnung von Grad Celsius ($^{\circ}\text{C}$) in Grad Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) kann durch eine lineare Funktion F beschrieben werden:


$$F(C) = k \cdot C + d$$

C ... Temperatur in $^{\circ}\text{C}$

$F(C)$... umgerechnete Temperatur von $^{\circ}\text{C}$ auf $^{\circ}\text{F}$

Der Funktionsgraph von F ist rechts dargestellt.

- 1) 10°C entsprechen 50°F , und -10°C entsprechen 14°F .
Zeichne die zugehörigen Punkte am Graphen rechts ein.
- 2) Berechne die Steigung k und interpretiere diesen Wert im gegebenen Sachzusammenhang.




$$k = \frac{\Delta F}{\Delta C} = \frac{50^{\circ}\text{F} - 14^{\circ}\text{F}}{10^{\circ}\text{C} - (-10^{\circ}\text{C})} = \frac{36^{\circ}\text{F}}{20^{\circ}\text{C}} = 1,8^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$$

Eine Temperaturzunahme um 1°C entspricht einer Temperaturzunahme um $1,8^{\circ}\text{F}$.

- 3) Berechne d und interpretiere diesen Wert im gegebenem Sachzusammenhang.

$$d = F(10) - k \cdot 10 = 50 - 1,8 \cdot 10 = 32^{\circ}\text{F}$$

Eine Temperatur von 0°C entspricht einer Temperatur von 32°F .



Links ist der Graph einer linearen Funktion f dargestellt.

a) Trage Zahlen richtig in die Kästchen ein.

Es gilt: $f(4) = 1$

Die Gleichung $f(x) = 4$ hat die Lösung $x = -2$.

Die **Nullstelle** von f ist die Lösung der Gleichung $f(x) = 0$, also $x = 6$.

b) Ermittle eine Funktionsgleichung von f .

c) Die Punkte $A = (42 | -18)$ und $B = (-78 | 42)$ liegen am Funktionsgraphen von f .

Berechne jeweils die fehlende Koordinate.

$$f(x) = k \cdot x + d \quad \text{mit} \quad k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{-2}{4} = -0,5 \quad \text{und} \quad d = 3$$

$$\implies f(x) = -0,5 \cdot x + 3$$

$$f(42) = -0,5 \cdot 42 + 3 = -18$$

$$f(x) = 42 \iff 42 = -0,5 \cdot x + 3 \iff 39 = -0,5 \cdot x \iff x = -78$$



Eine Firma produziert Smartphones. Die Gesamtkosten K und die Gesamteinnahmen E (Erlös) hängen von der Anzahl der produzierten und verkauften Smartphones ab.

Für die sogenannte **Kostenfunktion K** und die **Erlösfunktion E** gilt bei dieser Firma:

$$K(x) = 15 \cdot x + 400$$


$$E(x) = 23 \cdot x$$

x ... produzierte/verkaufte Menge in Mengeneinheiten (ME)

$K(x)$... Gesamtkosten in Geldeinheiten (GE)

$E(x)$... Gesamteinnahmen in Geldeinheiten (GE)

Zum Beispiel: 1 ME = 1 Smartphone, 1 GE = €30



1) Die **Fixkosten** sind jene Kosten, die bei Produktion von 0 ME anfallen. Zum Beispiel: Miete, Gehälter. Ermittle die Fixkosten und trage sie in das richtige Kästchen rechts oben ein.

2) Berechne den Schnittpunkt S der beiden Funktionsgraphen.

Interpretiere die beiden Koordinaten des Schnittpunkts im Sachzusammenhang.

$$K(x) = E(x) \iff 15 \cdot x + 400 = 23 \cdot x \iff 400 = 8 \cdot x \iff x = 50 \text{ ME}$$

$$K(50) = E(50) = 1150 \text{ GE}$$

Wenn 50 ME produziert und verkauft werden, dann sind die Kosten und Einnahmen mit 1150 GE gleich.

Bezeichnungen in der **Kosten- und Preistheorie**: **Untere Gewinngrenze**, **Gewinnschwelle** bzw. **Break-even-Point**

