Stammfunktionen MmF

Für die Funktion f gilt: $f(x) = 4 \cdot \sin(x) + x^2$

1) Ermittle (ohne Technologieeinsatz) alle Stammfunktionen von f.

2) Ermittle (ohne Technologieeinsatz) jene Stammfunktion F von f, die $F(0) = 3$ erfüllt.



Rechts oben sieht du, wie man diese Aufgabe mit dem Befehl **Integral**(<Funktion>)
in der CAS-Ansicht lösen kann. Den Befehl in Zeile 4 musst du nicht händisch eingeben.
Du kannst stattdessen das Ergebnis $\{c_1 = 7\}$ aus Zeile 3 mit der Maus in Zeile 2 ziehen (Drag & Drop).

Wenn die unabhängige Variable x heißt, wird ein weißer Kreis unter der Zeilennummer 4 angezeigt.
Mit Klick auf den Kreis wird eine Funktion erstellt und der Graph in der Grafik-Ansicht angezeigt.

Stammfunktionen MmF

Für eine Geschwindigkeit-Zeit-Funktion v gilt:

$$v(t) = 4 \cdot e^{-0{,}5 \cdot t} + 2$$

t ... Zeit in Sekunden
$v(t)$ ... Geschwindigkeit in m/s

1) Ermittle eine Gleichung der zugehörigen Weg-Zeit-Funktion s, die $s(0) = 0$ erfüllt.

2) Ermittle die mittlere Geschwindigkeit im Zeitintervall $[1; 3]$.

3) Die Geschwindigkeit-Zeit-Funktion v ist streng monoton fallend.
Um wie viel Prozent ist der zurückgelegte Weg im Zeitintervall $[0; 5]$ größer als jener in $[5; 10]$?

Bestimmtes Integral MmF

Der Graph der Funktion f mit $f(x) = x^2 - 2 \cdot x + 3$ ist rechts dargestellt.



1) Eine Fläche mit Inhalt A ist rechts markiert.
Stelle mithilfe von f eine Formel zur Berechnung von A auf.

$A =$

2) Berechne A mit dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung.

Rechts siehst du, wie man das bestimmte Integral mit dem Befehl **Integral**(<Funktion>, <Startwert>, <Endwert>) ermitteln kann.
Wenn du diesen Befehl in der Eingabezeile verwendest, wird die entsprechende Fläche auch in der Grafik-Ansicht markiert.



Bestimmtes Integral MmF

Für die rechts dargestellte Beschleunigung-Zeit-Funktion a gilt:

$$a(t) = 3 \cdot e^{-0{,}2 \cdot t} \cdot \sin(t)$$



t ... Zeit in Sekunden
$a(t)$ ... Beschleunigung in m/s^2

1) Ermittle den dargestellten orientierten Flächeninhalt F. Welche Einheit hat das Ergebnis?

Aus dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung folgt:

$$F = \int_1^8 \underbrace{a(t)}_{=v'(t)} \, \mathrm{d}t = v(t) \Big|_1^8 = v(8) - v(1)$$

2) Welche Bedeutung hat der Wert von F also für die Geschwindigkeit?

3) Die Anfangsgeschwindigkeit beträgt $v(0) = 4\,\mathrm{m/s}$.
Ermittle den zurückgelegten Weg im Zeitintervall $[3; 7]$.

Allgemeine Sinusfunktion

Für die rechts dargestellte Funktion f gilt:

$$f(x) = 2 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} \cdot x\right)$$



Im Intervall $[0;6]$ schließt der Graph mit der x-Achse eine Fläche mit Inhalt A ein.

1) Trage Zahlen richtig in die Kästchen ein.

i) $\int_{0}^{6} f(x)\,\mathrm{d}x = \square$ **ii)** $A = 2 \cdot \int_{\square}^{\square} f(x)\,\mathrm{d}x$ **iii)** $A = \int_{\square}^{\square} |f(x)|\,\mathrm{d}x$

2) Ermittle A.

$|f(x)|$ kannst du im CAS entweder mit den senkrechten Betragsstrichen oder mit **abs**$(f(x))$ eingeben.

Zwischenfläche

Für die rechts dargestellten Funktionen f und g gilt:

$$f(x) = -5 \cdot x^2 + 35 \cdot x$$

$$g(x) = 3 \cdot x^3 - 35 \cdot x^2 + 98 \cdot x$$



Die beiden markierten Flächen haben zusammen den Inhalt A.

1) Ermittle die Schnittstellen $s_1 = \square$, $s_2 = \square$ und $s_3 = \square$.

2) Trage Zahlen richtig in die Kästchen ein.

i) $A = \int_{\square}^{\square} [g(x) - f(x)]\,\mathrm{d}x + \int_{\square}^{\square} [f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x$ **ii)** $A = \int_{\square}^{\square} |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x$

Links unten siehst du 3 Möglichkeiten, um den Flächeninhalt A im CAS zu ermitteln.

Verwendest du den Befehl **IntegralZwischen**(<Funktion>, <Funktion>, <Startwert>, <Endwert>) in der Eingabezeile, wird die entsprechende Zwischenfläche auch in der Grafik-Ansicht markiert.

CAS

1	f(x):=-5*x^2+35*x
	→ **f(x) := $-5\,x^2 + 35\,x$**
2	g(x):=3*x^3-35*x^2+98*x
	→ **g(x) := $3\,x^3 - 35\,x^2 + 98\,x$**
3	Löse(f(x)=g(x))
	→ **{x = 0, x = 3, x = 7}**
4	Integral(g-f,0,3)+Integral(f-g,3,7)
	≈ **234.25**
5	IntegralZwischen(g,f,0,3) + IntegralZwischen(f,g,3,7)
	≈ **234.25**
6	Integral(|f-g|,0,7)
	≈ **234.25**

Die beiden markierten Flächen haben also zusammen den Flächeninhalt $A = \square$.

Funktion mit Parameter

Für die Funktion f gilt: $f(t) = a \cdot t^2$ mit $a \neq 0$

Ermittle (ohne Technologieeinsatz) alle Stammfunktionen von f.

$F(t) =$ ⬚

Rechts siehst du, warum man bei Funktionen mit Parametern im CAS aufpassen muss.

- Wenn die unabhängige Variable x heißt, wird richtig nach x integriert.
- Wenn die unabhängige Variable t heißt, wird *nicht* nach t integriert, sondern nach a.

CAS

1: f(x):=a*x^2 → f(x) := a x²

2: Integral(f(x)) → 1/3 a x³ + c₁

CAS

1: f(t):=a*t^2 → f(t) := a t²

2: Integral(f(t)) → 1/2 a² t² + c₁

Damit das CAS richtig nach t integriert, kannst du den Befehl

Integral(<Funktion>, <Variable>)

wie rechts dargestellt verwenden.

CAS

1: f(t):=a*t^2 → f(t) := a t²

2: Integral(f(t),t) → 1/3 a t³ + c₁

Funktion mit Parameter

Für die Funktion f gilt: $f(t) = a \cdot t^2$ mit $a \neq 0$

Berechne a so, dass der Funktionsgraph mit der waagrechten Achse im Intervall $[0; 5]$ den Flächeninhalt 175 einschließt.



Bundesministerium Bildung, Wissenschaft und Forschung

Die Form eines Weizenbierglases kann näherungsweise durch die Rotation des Graphen der Funktion g um die x-Achse dargestellt werden (siehe nebenstehende Abbildung). Es gilt:

$g(x) = -0{,}00108 \cdot x^3 + 0{,}046 \cdot x^2 - 0{,}4367 \cdot x + 3$ mit $2 \leq x \leq 25$

x, $g(x)$ ... Koordinaten in cm

Berechnen Sie das Füllvolumen des Weizenbierglases in Litern.



Dieses Werk des Projekts MmF unterliegt einer CC BY-NC-ND 4.0 Lizenz.
https://mmf.univie.ac.at