

# Universität Wien

Fakultät für Mathematik

Maria Charina und Stefan Haller

Zur Verfügung gestellt von:

Maria Charina und Stefan Haller

PR StEOP Einführung in die Mathematik, WiSe 2018/19

LV-Nr.: 250032

Fakultät für Mathematik, Universität Wien

Danke!

DAUER: 60 Minuten
-------------------

## STEOP: Modulprüfung - Einführung in die Mathematik

3. Termin am 30.01.2019, 08:00-09:30 Uhr in HS 1 und HS 14

Prüfungseinsicht: 01.03.2019, 13:30-14:30Uhr im Raum 11.122

Nachname: ..... Vorname: .....

Matrikelnummer: ..... Studienkennzahl: .....

1. Antritt

2. Antritt

3. Antritt

4. Antritt

Sie können maximal 40 Punkte erreichen. Mit mindestens 20 Punkten ist die Prüfung bestanden.

1	2	3	4	5	6	$\Sigma$	Note

Notenskala:

Note	5	4	3	2	1
Punkte	< 20	20 – 24	25 – 29	30 – 34	$\geq 35$

**Aufgabe 1:** ..... (6 Punkte)

(i) Definieren Sie den Begriff *neutrales Element* einer Gruppe  $(G, \circ)$ .

(ii) Zeigen oder widerlegen Sie: Die Verknüpfung  $\otimes : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \otimes b = a \cdot b - 2$  ist assoziativ.

**Aufgabe 2:** ..... (8 Punkte)

Beweisen Sie **mittels vollständiger Induktion**: Für alle  $q \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$  und alle  $n \in \mathbb{N}$  gilt  $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ .

**Aufgabe 3:** ..... (6 Punkte)

Ergänzen Sie die folgende Tabelle und geben Sie die entsprechenden Rechenschritte an.

$z$	$\bar{z}$	$z^2$	$ z ^2$	$0 \leq \phi = \arg(z) < 2\pi$
		$-i$		$\pi \leq \phi < 2\pi$
			2	$\frac{5\pi}{4}$

**Aufgabe 4:** ..... (7 Punkte)

(i) Für die Funktion  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sin(x) + 1$  und die Mengen  $A = [0, \pi)$  und  $B = [-1, 1]$  bestimmen Sie die Bildmenge  $f(A)$  und die Urbildmenge  $f^{-1}(B)$ .

(ii) Für die Funktionen

$$f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1], f(x) = \sin(x + 1) \quad \text{und} \quad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = x^2.$$

bestimmen Sie die Funktion  $f \circ g$ , falls diese existiert. Geben Sie gegebenenfalls den Definitions- und Bildbereich von  $f \circ g$  an.

**Aufgabe 5:** ..... (8 Punkte)

Bestimmen Sie mit Hilfe des Euklidischen Algorithmus die ganzen Zahlen  $n$  und  $m$ , so dass  $\text{ggT}(25, 11) = n \cdot 25 + m \cdot 11$ .

Geben Sie alle Rechenschritte an.

**Aufgabe 6:** ..... (5 Punkte)

Kreuzen Sie jeweils nur eine Antwort an. Jede richtige Antwort wird mit +1 Punkt und jede falsche Antwort mit -1 Punkt bewertet. Ist die so erhaltene Gesamtpunktzahl negativ, runden wir sie auf 0 auf.

(a) Für alle  $n \in \mathbb{N}$  gilt  $\sum_{i=1}^n \left( \sum_{j=1}^n 6^{i+j} \right) = \left( \sum_{i=1}^n 2^i \right) \left( \sum_{j=1}^n 3^j \right)$ .

Wahr

Falsch

(b) Seien  $p, q$  Aussagen. Eine Verneinung von  $p \vee (\neg p \wedge \neg q)$  ist

$\neg p \wedge (\neg p \Rightarrow q)$

$\neg p \wedge (\neg p \vee \neg q)$

(c) Alle reellen Lösungen von  $x + 1 < |x|$  erfüllen

$x \in (-\frac{1}{2}, \infty)$

$x \in (-\infty, -\frac{1}{2})$

(d) Die Umkehrfunktion von  $f : [1, \infty) \rightarrow [-1, \infty)$ ,  $f(x) = x^2 - 2x$  existiert.

Wahr

Falsch

(e) Sei  $M$  eine nicht leere Menge. Die Relation  $\subseteq$  ist eine Äquivalenzrelation auf  $\mathcal{P}(M)$ .

Wahr

Falsch