

# Universität Wien

Fakultät für Mathematik

Maria Charina und Stefan Haller

DAUER: 60 Minuten

Zur Verfügung gestellt von:

Maria Charina und Stefan Haller

PR StEOP Einführung in die Mathematik, WiSe 2018/19

LV-Nr.: 250032

Fakultät für Mathematik, Universität Wien

Danke!

## STEOP: Modulprüfung — Einführung in die Mathematik

4. Termin am 14. März 2019, 13:15–14:45 Uhr in HS 1

Nachname: ..... Vorname: .....

Matrikelnummer: ..... Studienkennzahl: .....

1. Antritt

2. Antritt

3. Antritt

4. Antritt

Sie können maximal 40 Punkte erreichen. Mit mindestens 20 Punkten ist die Prüfung bestanden.

1	2	3	4	5	6	$\Sigma$	Note

Notenskala:

Note	5	4	3	2	1
Punkte	< 20	20 – 24	25 – 29	30 – 34	$\geq 35$

**Aufgabe 1:** ..... (7 Punkte)

- (a) Wann wird eine Abbildung  $f: A \rightarrow B$  injektiv genannt? Geben Sie eine präzise Definition.
- (b) Zeigen oder widerlegen Sie folgende Aussage: Die Abbildung  $g: (2, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(x) := \frac{1}{2-x}$ , ist surjektiv.

**Aufgabe 2:** ..... (8 Punkte)

Beweisen Sie folgende Aussage **mittels vollständiger Induktion**: Für alle natürlichen Zahlen  $n \geq 1$  gilt

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \leq 2 - \frac{1}{n}.$$

**Aufgabe 3:** ..... (5 Punkte)

(a) Bestimmen Sie alle Elemente  $x \in \mathbb{Z}_6$ , die der Gleichung  $\bar{2} \cdot x + \bar{3} = \bar{5}$  genügen.

(b) Geben Sie zwei Elemente  $\bar{a} \neq 0$  und  $\bar{b} \neq 0$  in  $\mathbb{Z}_{14}$  an, für die  $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$  gilt.

**Aufgabe 4:** ..... (8 Punkte)

(a) Bestimmen Sie eine reelle Zahl  $a$ , sodass für die Funktionen

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, & f(x) &:= a \cdot x, \\ g: \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{R}, & g(n) &:= 2^n, \quad \text{und} \\ h: \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}, & h(n) &:= n + 3 \end{aligned}$$

die Gleichung  $f \circ g = g \circ h$  gilt.

(b) Für die Funktion

$$p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad p(x) := (x - 1)^2(x + 1)^2$$

bestimmen Sie die Urbildmengen  $p^{-1}(0)$  und  $p^{-1}(B)$ , wobei  $B := (-\infty, 0)$ .

**Aufgabe 5:** ..... (7 Punkte)

(a) Sei  $f: X \rightarrow Y$  eine Abbildung und seien  $B_1, B_2$  zwei Teilmengen von  $Y$ . Zeigen Sie

$$f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2).$$

(b) Sei  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(x) := x^2$ . Bestimmen Sie zwei Teilmengen  $A_1$  und  $A_2$  von  $\mathbb{R}$ , für die

$$g(A_1 \cap A_2) \neq g(A_1) \cap g(A_2)$$

gilt. Geben Sie weiters  $g(A_1 \cap A_2)$  und  $g(A_1) \cap g(A_2)$  an.

**Aufgabe 6:** ..... (5 Punkte)

Kreuzen Sie jeweils nur eine Antwort an. Jede richtige Antwort wird mit +1 Punkt und jede falsche Antwort mit -1 Punkt bewertet. Ist die so erhaltene Gesamtpunktzahl negativ, runden wir sie auf 0 auf.

(a) Zu jeder Menge  $A$  existiert eine Menge  $B$  sodass  $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \emptyset$ .

wahr

falsch

(b) Sind  $f: A \rightarrow B$  und  $g: B \rightarrow C$  zwei surjektive Abbildungen, dann muss auch  $g \circ f$  surjektiv sein.

wahr

falsch

(c) Welche der folgenden komplexen Zahlen stimmt mit  $1 + \mathbf{i} + \mathbf{i}^2 + \mathbf{i}^3$  überein?

$\mathbf{i}$

0

(d) Die Aussage  $(p \wedge (p \Rightarrow q)) \Rightarrow q$  ist eine Tautologie.

wahr

falsch

(e) Die Verknüpfung  $\otimes: \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ ,  $x \otimes y := xy^2$  ist kommutativ.

wahr

falsch

Zusatzblatt: